



God, forgiftningsfri påske

Vær klar over disse forgiftningsfarene i påskeferien.

Både hjemme og på hytta finnes det farer som kan ødelegge påskehyggen.

Ved mistanke om forgiftning, kontakt Giftinformasjonen (telefon: 22 59 13 00) så fort som mulig.

Lys og opptenning

Fyrstikker

Dagens fyrstikker inneholder ikke svovel, men kaliumklorat. Barn må vanligvis få i seg over 20 fyrstikkhoder før det er fare for forgiftning.

Stearin

Det er ikke farlig hvis barn får i seg litt stearin. Stearinet vil komme ut igjen av seg selv og vil ikke bli tatt opp i kroppen.

Lampeolje

Svelging av lampeolje og andre petroleumsprodukter er farlig. Til og med inntak av små mengder kan føre til kjemisk lungebetennelse. Ring Giftinformasjonen og kontakt lege dersom uhellet er ute.

Gode råd:

- Ikke framkall brekninger
- Gi flytende, fettholdig drikke, som for eksempel noen spiseskjeer mykgjort/smeltet fløteiskrem eller kremfløte. Dette reduserer risikoen for at petroleumsproduktet kommer over i lungene.
- Fettholdig drikke må ikke tvinges i personen, det kan utløse brekninger.

Kontakt lege eller sykehus ved symptomer som:

- hoste
- irritasjon fra luftveiene
- sløvhet
- tretthet
- blekhet

Dersom slike tegn ikke forekommer i løpet av seks timer etter inntaket, regnes vanligvis faren som over.

Tennbriketter

Tennbriketter inneholder også petroleumsprodukter, men på grunn av konsistensen er de som regel ikke farlige.

Vær imidlertid oppmerksom på at det finnes tennbriketter med flytende kjerne. Dette øker faren for forgiftning. Ved svelging av slike produkter, følg de samme anbefalingene som ved svelging av lampeolje (over).

Påskeplanter

Snøklokke

Panten inneholder irriterende stoffer som kan føre til:

- kvalme
- brekninger
- diaré

Gi drikke ved inntak av snøklokker. Kontakt Giftinformasjon og lege for å få vurdert skaderisikoen.

Tulipan, påskelilje og pinselilje

Hele planten, men spesielt løken, inneholder stoffer som kan føre til:

- irriterte slimhinner
- kvalme
- brekninger
- diaré

Gi drikke ved inntak av plantedeler. Dersom større mengder er spist, kan det være aktuelt å behandle med medisinsk kull. Ta gjerne kontakt med Giftinformasjonen for å få en vurdering av

situasjonen.

Skismøring, klister og klisterfjerner

Skismøring/voks

Inneholder petroleumsprodukter. Faren for kjemisk lungebetennelse er imidlertid svært lav på grunn av konsistensen. Ved inntak, gi likevel litt drikke slik at personen får skylt munn og svelg.

Klister

Klister inneholder stoffer som kan irritere hud og slimhinner. De kan også allergiske reaksjoner som astma og utslett. Kommer klisteret i kontakt med huden, er det viktig å skylle/vaske huden så raskt som mulig. Blir klisteret spist, bør en gi drikke.

Klisterfjerner

Klisterfjerner kan inneholde ulike stoffer. Dersom noen har fått i seg klisterfjerner, kontakt Giftinformasjonen og lege for å få vurdert forgiftningsrisikoen.

Rottegift

Rottegift kan være farlig for mennesker. Sørg for å legge ut giften slik at den ikke er lett tilgjengelig for barn eller kjæledyr.

Muse- og rottegift som brukes i Norge inneholder som regel antikoagulantia (stoffer som hindrer blodet i å levre seg). Stoffene hemmer nydannelsen av vitamin K i kroppen som gir økt blødningstendens. Vitamin K er nødvendig for at blodet skal levre seg, eller koagulere, normalt.

Kroppen bruker lang tid på å kvitte seg med giftstoffene. Den økte blødningstendensen kan dermed vedvare lenge.

Symptomene avhenger av hvor mye rottegift en har fått i seg:

- Ved lett forgiftning vil påvirkning kun bli oppdaget ved hjelp av blodprøver.
- Ved moderat forgiftning kan en få bloduttredelser, blod i urin og avføring, tannkjøttblødninger og økt blødning fra små sår og kutt.
- Ved alvorlig forgiftning får en indre blødninger, blant annet fra mage- og tarmsystemet og i hjernen.

Dersom noen har fått i seg rottegift, kontakt Giftinformasjonen og lege for å få vurdert situasjonen.

Hunder og sjokolade

Ikke gi hunder sjokolade. De tåler ikke et stoff som finnes i kakaobønner (theobroma cacao). Mørk sjokolade inneholder mer kakao, og dermed mer av dette stoffet i seg, enn lys melkesjokolade.

Hunder som har fått i seg sjokolade, kan få symptomer som:

- brekninger
- diaré
- hyperaktivitet
- økt vannlating
- kramper
- feber
- rask puls
- koma

En plate mørk kokesjokolade kan gi en liten hund alvorlig forgiftning. Dersom du mistenker at hunden har fått i seg større mengder sjokolade, kontakt Giftinformasjonen og veterinær.

NB: Det finnes egne hundesjokolader som er trygge for hunder å spise. Spør i dyrebutikken.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om forgiftning og Giftinformasjonen på nettsidene til Sosial- og helsedirektoratet: <http://www.shdir.no/giftinfo/> (ekstern lenke).

Kilde:

Sosial- og helsedirektoratet